

済生会和歌山病院 がん化学療法レジメン

がん種： 【大腸がん】
レジメン名： Afibercept+FOLFIRI 療法
放射線治療併用： 【無】
1 コースの日数： 14 日

催吐リスク： 中等度リスク

投与回数上限：

■ 術後補助	■ 切除不能・再発
□ 有 回	□ 有 回
□ 無	□ 無

【レジメン内容】

No.	薬 剤 名	標準投与量		投与方法	投与時間	Day													
		単位				分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	生理食塩液	250	mL	ルートキープ		↓													
2	生理食塩液 アフリベルセプト注射液	250	mL	点滴静注	60分	↓													
		4	mg/kg	点滴静注	60分	↓													
3	生理食塩液 ホスアプレビタント注射液	100	mL	点滴静注	60分	↓													
		150	mg	点滴静注	60分	↓													
4	パロノセトロン点滴静注液0.75mg デキサメタゾン注射液3.3mg	0.75	mg	点滴静注	15分	↓													
		4.95	mg	点滴静注	15分	↓													
5	5%糖液 レボホリナート注射液	250	mL	点滴静注	120分	↓													
		200	mg/m2	点滴静注	120分	↓													
6	5%糖液 イリノテカン注射液	250	mL	点滴静注	120分	↓													
		150	mg/m2	点滴静注	120分	↓													
7	生理食塩液 5-FU注	50	mL	点滴静注	15分	↓													
		400	mg/m2	点滴静注	15分	↓													
8	生理食塩液 5-FU注	230	mL	持続		↓ ↓													
		2400	mg/m2	持続		↓ ↓													