

# 済生会和歌山病院 がん化学療法レジメン

がん種： 【大腸がん】  
 レジメン名： XELIRI + Bevacizumab 療法  
 放射線治療併用： 【無】  
 1コースの日数： 21 日

催吐リスク： 中等度リスク

【備考】

●ベバシズマブ投与時間：30～90分

投与回数上限：  
 術後補助  切除不能・再発  
 有 回  有 回  
 無  無

## 【レジメン内容】

No.	薬剤名	標準投与量 単位	投与方法	投与時間 分	Day																					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	カベシタビン錠	2000 mg/m <sup>2</sup>	内服		分1	分2	分1																			
2	センノシド	24 mg	内服		分1																					
3	ヒルドイドクリーム	2 袋	外用		↓																					
4	ピリドキサル錠	3 管	内服		分1	分3	分2																			
5	生理食塩液	250 mL	ルートキープ		↓																					
6	生理食塩液 ベバシズマブ注射液	100 mL 7.5 mg/kg	点滴静注 点滴静注		↓ ↓																					
7	生理食塩液 ホスアプレピタント注射液	100 mL 150 mL	点滴静注 点滴静注	30分 30分	↓ ↓																					
8	パロノセトロン点滴静注0.75mg デキサメタゾン注射液3.3mg	0.75 mg 4.95 mg	点滴静注 点滴静注	15分 15分	↓ ↓																					
9	生理食塩液 イリノテカン注射液	500 mL 200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 点滴静注	90分 90分	↓ ↓																					