

済生会和歌山病院 がん化学療法レジメン

がん種： 【大腸がん】
 レジメン名： Encorafenib+Binimetinib+Cetximab併用療法
 放射線治療併用： 【無】
 1コースの日数： 7 日

催吐リスク： 最小度リスク

投与回数上限：
 術後補助 切除不能・再発
 有 回 有 回
 無 無

【備考】

●セツキシマブ：
 初回のみ400mg/m²で120分かけて
 投与
 ●BRAF陽性

【レジメン内容】

No.	薬剤名	標準投与量		投与方法	投与時間	Day													
		単位				分	0	1	2	3	4	5	6	7	8				
1	ジフェンヒドรามミン塩酸塩錠10mg	50	mg	内服		分1													
2	ロコイドクリーム	1	本	外用		↓													
3	ミノサイクリン錠	100	mg	内服		分1	分1	分1	分1	分1									
4	エンコラフェニブカプセル	300	mg	内服		分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1							
5	ピニメチニブ錠	90	mg	内服		分1	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分1					
6	生理食塩液	250	mL	ルートキープ		↓													
7	生理食塩液 ファモチジン注射液20mg	100 20	mL mg	点滴静注 点滴静注	15分 15分	↓ ↓													
8	生理食塩液 セツキシマブ注射液	250 250	mL mg/m2	点滴静注 点滴静注	120分 60分	↓ ↓													