

済生会和歌山病院 がん化学療法レジメン

がん種： 【大腸がん】
 レジメン名： Encorafenib+Cetximab併用 療法
 放射線治療併用： 【無】
 1コースの日数： 7 日

催吐リスク： 最小度リスク

投与回数上限：
 術後補助 切除不能・再発
 有 回 有 回
 無 無

【備考】

●セツキシマブ：
 初回のみ400mg/m²で120分かけて
 投与
 ●BRAF陽性

【レジメン内容】

No.	薬剤名	標準投与量		投与方法	投与時間	Day										
		単位				分	0	1	2	3	4	5	6	7		
1	ロコイドクリーム	1	本	外用			↓									
2	ミノサイクリン錠	100	mg	内服			分1	分1	分1	分1	分1					
3	エンコラフェニブカプセル	300	mg	内服			分1									
4	ジフェンヒドラミン塩酸塩錠10mg	50	mg	内服			分1									
5	生理食塩液	250	mL	ルートキープ			↓									
6	生理食塩液	100	mL	点滴静注	15分		↓									
	ファモチジン注射液20mg	20	mg	点滴静注	15分		↓									
7	生理食塩液	250	mL	点滴静注	60分		↓									
	セツキシマブ注射液	250	mg/m ²	点滴静注	60分		↓									